




آموزش به بیمار

استنت عروق قلب



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

محدودیت در عمل های جراحی غیر قلبی

اگر شما می بایست عمل جراحی غیر قلبی در سال اول بعد از جایگذاری استنت انجام دهید می بایست: در صورت امکان، عمل جراحی غیر قلبی خود را به مدت یک سال پس از استنت گذاری به تعویق بیندازید.

• اگر عمل جراحی را نمی توان به تعویق انداخت، در مورد داروهای مصرفی خود از قبیل آسپیرین یا کلوپیدوگرل با پزشک خود صحبت کنید. دوز داروی شما ممکن است نیاز به تنظیم شدن داشته باشد.

منبع: www.Clinical key.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۷۷ تماس بگیرید.

تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی:



بعد از قرار دادن استنت چه کارهایی باید انجام


دهید؟

نگاهی به آسپیرین

پزشک توصیه خواهد کرد که شما بصورت روزانه و به طور نامحدود آسپیرین مصرف کنید. این کار به منظور کاهش خطر لخته شدن خون در داخل استنت است.

مصرف داروهای ضد لخته شدن

به شما داروهای ضد لخته شدن مانند کلوپیدوگرل (پلاویکس) و زیلت داده می شود. چرا که خطر ابتلا به لخته شدن استنت را برای حداقل یک سال پس از استنت گذاری کاهش می دهد. و همچنین برای بیشتر افراد با استنت فلزی، داروهای ضد لخته شدن فقط برای یک ماه پس از جایگذاری استنت توصیه می شود.




مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید .



فنر یا استنت نوعی لوله کوچک مشبک و توری مانند است که در داخل رگ بسته قرار می گیرد و آن را باز نگه می دارد .

بالن برای باز کردن رگ بسته قلب بکار می رود و استنت روی آن زده می شود .استنت برای باز نگه داشتن شریان های کرونر قلبیاستفاده می شود.



نحوه کار گذاشتن استنت (فنر) در عروق قلبی

استنت (فنر) یک قطعه لوله ای شکل است که از بافت سیمی مارپیچی شکل ساخته می شود. استنت بر روی بالون در نوک کاتتر قرار می گیرد و به سمت سرخرگ کرونری دچار انسداد هدایت می شود. سپس بالون باد می شود و استنت متسع شده و در محل انسداد قفل می شود و به منزله حائلی رگ را باز نگه می دارد. باد بالون خالی شده و کاتتر خارج می شود، ولی استنت در محل باقی می ماند. ظرف چند هفته، بافت های جدیدی بر روی سطح استنت تشکیل می شوند، بطوریکه سطح داخلی سرخرگ ها کاملاً صاف و صیقلی می شود . استنت گذاری ممکن است به تنهایی هم انجام شود، اما معمولاً همراه با آنژیوپلاستی انجام می شود. پزشک ممکن است در طی یک آنژیوپلاستی، بر روی چندین سرخرگ مسدود شده اقدام نماید.

انواع استنت

۱- استنت دارویی

۲- استنت فلزی

شایعترین عوارض استنت گذاری:

خونریزی از شایعترین عوارض آنژیوپلاستی یا فنر گذاشتن قلب است

پارگی رگ قلب

تنگ شدن مجدد شریان بعد از بالون زدن قلب

