



آموزش به بیمار

نقص دیواره ی بین دهلیزی (ASD)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

- به منظور کاهش درد می توانید از مسکن طبق دستور پزشک استفاده کنید.

- از کارهایی که موجب خستگی زیاد یا تنگی نفس می شود پرهیز کنید.

- در صورت مراجعه به دندان پزشک حتما اطلاع دهید قرص وارفارین مصرف میکنید.

- وهرگونه خونریزی غیرطبیعی دیدید اولین کار قرص وارفارین را قطع وبه پزشک مراجعه میکنید.

منبع: www.Clinical key.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۶۸

تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی :



مراقب در منزل

استفاده درست و به موقع از دارو های نظیر وارفارین برای جلوگیری از تشکیل لخته

رعایت رژیم کم نمک و کم چرب

فعالیت بعد از جراحی در حد تحمل است ، اما قبل از جراحی در بعضی مواقع نیازی به محدودیت فعالیت وجود ندارد.




مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



تعریف:

یکی از بیماری های مادر زادی قلب وجود نقص یا سوراخ میان دهلیز ها می باشد این بیماری در بیشتر موارد بدون علامت بوده و تنها علامت آن خستگی در هنگام فعالیت و تپش قلب می باشد.



علائم:

تنگی ، نفس ، خستگی ، تپش قلب و صدای اضافی قلبی ، و بستگی به اندازه حفره دارد که هرچه بزرگتر باشد علائم و نشانه های وخیم تری دارد.



عوامل ایجاد کننده و عوامل خطر:

دلیل وقوع نقص در دیواره بین دهلیز ها مشخص نیست ولی نقایص مادر زادی در برخی از خانواده ها به همراه دیگر مشکلات ژنتیکی مثل منگولیسم اتفاق می افتد.

تشخیص:

اکو کاردیو گرافی ، عکس قفسه سینه ، آنژیوگرافی قلبی



درمان:

در صورت کوچک بودن این نقص نیاز به درمان نیست اما اگر سوراخ بزرگ باشد و یا نقایص دیگری همراه نباشد از طریق آنژیو محل سوراخ بسته می شود و در صورت همراه بودن نقایص دیگر قلبی همراه با نقص دیواره بین دهلیزی عمل جراحی قلب صورت میگیرد.