



آموزش به بیمار

تعویض دریچه آئورت (AVR)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

- به منظور کاهش درد می توانید از مسکن طبق دستور پزشک استفاده کنید.
- از کارهایی که موجب خستگی زیاد یا تنگی نفس می شود پرهیز کنید.
- در صورت مراجعه به دندان پزشک حتما اطلاع دهید قرص وارفارین مصرف میکنید.
- و هرگونه خونریزی غیرطبیعی دیدید اولین کار قرص وارفارین را قطع و به پزشک مراجعه میکنید.



منبع: www.Clinical key.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۶۸ تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی:



مراقبت در منزل:


- استفاده درست و به موقع از دارو های نظیر وارفارین برای جلوگیری از تشکیل لخته
- رعایت رژیم کم نمک و کم چرب
- فعالیت بعد از جراحی در حد تحمل است ، اما قبل از جراحی در بعضی مواقع نیازی به محدودیت فعالیت وجود ندارد.

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید




تعریف:

آنورت بزرگترین سرخرگ بدن می باشد که خون را از بطن چپ قلب دریافت نموده و به اعضا و اندام های گوناگون بدن می رساند. در مسیر خروج خون در آنورت ، دریچه آنورت وجود دارد که پس از انقباض بطن چپ قلب این دریچه بسته شده و در نتیجه مانع از برگشت خون از آنورت به قلب خواهد بود.



علائم:

بیماری های دریچه ای قلب معموما بدون نشانه می باشد اما بیشتر موارد با علائمی از قبیل احساس ضعف و خستگی تنگی نفس ، افزایش فشار خون و یا ایجاد صداهای غیر طبیعی در قلب فرد بیمار خواهد شد.




عوامل ایجاد کننده و عوامل خطر:

سابقه ی خانوادگی ، تب رماتیسمی ، نقایص مادر زادی قلبی و بالا بودن فشار خون.

تشخیص:

اکوکاردیو گرافی ، تست ورزش و آنژیوگرافی



درمان:

درمان دارویی موثر برای تنگی آنورت وجود ندارد. کنترل عوامل خطر موجب کاهش پیشرفت آن می شود و تعویض دریچه آنورت تنها درمان موثر برای تنگی آنورت شدید است.