



آموزش به بیمار

دو لایه شدن شریان آئورت (دایسکشن)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید:

اگر درد شدید در قفسه سینه و احساس کردید باید فوراً به اورژانس انتقال داده شود و هرگز داروهای فشار خون را فراموش نکنید و دردهای قفسه سینه را نیز جدی بگیرید.



منبع: www.Clinical key.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۶۸ تماس بگیرید.




با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی :



مراقبت در منزل:

۱. کنترل فشار خون
۲. کاهش مصرف نمک
۳. ورزش و کم کردن وزن
۴. عدم مصرف دخانیات




مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



تعریف:

خونریزی به داخل لایه های شریان آئورت را دایسکشن می گویند. آئورت دارای سه لایه است و بزرگترین شریان بدن انسان درخون رسانی به اندامها از طریق قلب می شود. آئورت زمانی که از قلب جدا می شود به آئورت صعودی و سپس ناحیه ای که جهت خون رسانی مغز و گردن است تقسیم می شود و درنهایت به آئورت نزولی ختم می گردد. آئورت نزولی قفسه سینه و شکم و سپس اندامهای تحتانی را خون رسانی می کند.



علائم:


درد تیز و برنده در زیر قفسه سینه که به گردن و بین دو کتف و دست انتقال می یابد. که درد بصورت ناگهانی و شدید است. تنفسهای سطحی، مشکلات کلیوی، تهوع، تعریق را به همراه دارد.



عوامل ایجاد کننده وعوامل خطر:

دایسکشن آئورت معمولاً به دلیل شکننده بودن عروق و نیز فشار خون بالا به وجود می آید.

۱. جنس مذکر
۲. سن ۵۰ تا ۷۰ سال
۳. استعمال دخانیات
۴. فشار خون بالا
۵. بیماریهای خاص قلبی
۶. آسیب قفسه سینه



تشخیص:

تصویر برداری از قفسه سینه با اشعه ایکس وسی تی اسکن وام ار ای درمان:

۱. داروهای داخل رگی اکسیژن برای کاهش فشار خون و پیشگیری از پارگی بیشتر برای آسیب آئورت.
۲. جراحی اورژانس برای برداشت بخش پاره شده آئورت اگر نشت وجود داشت، ترمیم جایگزینی دریچه ی آئورت و یا بازسازی آئورت با گرافت مناسب.
۳. دارودرمانی طولانی مدت معمولاً شامل بتا بلوکر و یا مسدودکننده های کلسیمی
۴. داروهای کاهنده، کلسترول و تغییرات رژیم غذایی