



آموزش به بیمار

شکستن سنگ حالب از طریق

مجرای ادرار (TUL)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزشی سلامت



منبع: www.Clinical key.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۴۷ تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی:



مراقبت در منزل:

معمولاً برای چند روز آنتی بیوتیک خوراکی و مسکن تجویز می شود.

توصیه می شود مایعات زیاد مصرف نمایید.

همچنین شما باید جهت کمک به دفع خرده سنگها فعالیت نموده و حتماً در یک ظرف ادرار نمایید تا در صورت دفع سنگ آنها را جهت انجام آزمایش بدست آورد.

مددجوی عزیز:

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



شکستن سنگ حالب از طریق

مجرای ادرار (TUL)

قولنج کلیه یک بیماری با درد شدید پهلوی بوده که بعلت گیر کردن سنگ ادراری در لوله حالب و بدنبال آن انسداد و تورم کلیه رخ می دهد. در اکثر موارد سنگ های کوچک حالب با تجویز مسکن خوبخود دفع می شوند ولی در موارد که سنگها بزرگتر باشند و باعث انسداد کامل لوله حالب شوند اورژانس محسوب می شود.

. در صورت عدم درمان آن ممکن است باعث تب و لرز و عفونت شدید کلیه و در نهایت از کارافتادگی کامل کلیه شود. امروزه این سنگها را می توان از طریق روش TUL از راه مجرا، بدون هیچگونه برشی بر شکم و بی هیچ دردی سنگ حالب را خارج نمود.

قبل از عمل سنگ حالب:

آسپرین و سایر داروهای ضدالتهاب از چند روز قبل می بایست قطع شوند. شما میتوانید صبح روز عمل ناشتا به بیمارستان مراجعه نمایید. ولی معمولاً روز قبل از عمل بستری میشوید و از شب قبل ناشتا بوده سرم تزریقی و آنتی بیوتیک شروع می شود. برای این عمل از روش بیحسی نخاعی استفاده می شود و در اغلب موارد نیاز به بیهوشی عمومی نیست.

بعد از جراحی:

در اغلب موارد سنگ حالب بطور کامل خارج شده و شما بعد از رفع بی حسی می توانید در همان روز مرخص شوید. در مواردیکه نیاز به گذاشتن لوله حالب وجود دارد حتماً تا بعد از چهار هفته برای خارج کردن آن به پزشک مراجعه نمایید.

