



آموزش به بیمار

کورتاژ



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزشی سلامت

*توجه داشته باشید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ

هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و

میتوانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ

مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.

منبع: www.Clinicalkey.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۴۷

بخش جراحی تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی :



در موارد زیر لازم است به پزشک خود

مراجعه نمایید:

۱-تب

۲-ترشحات زیاد و غیر طبیعی

۳-درد زیاد در قسمت زیر شکم

۴-افزایش خونریزی

۵-ترشحات بد بو



مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



دیلاتاسیون و کورتاژ؟

باز کردن دهانه ی رحم و تخلیه نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایع ترین عمل های زنان است. میتواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیر طبیعی زنان به کار رود.

خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیر طبیعی از واژن گردد. خونریزی غیر طبیعی به خونریزی گفته میشود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیفتد.

موارد خونریزی غیر طبیعی واژن

۱- بعد از تماس جنسی

۲- هنگام یائسگی یا بعد از آن

۳- در بین دو دوره قاعدگی به صورت لکه بینی

۴- ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه اول

حاملگی

عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی عمومی یا

بی حسی ناحیه ای، بعد از اینکه شما را در وضعیت

مناسبی قرار دادن که دسترسی به رحم آسان باشد،

انجام میشود. ابتدا دهانه رحم را متسع (باز) میکنند، در

صورتی که علت خونریزی سقط است محصولات

حاملگی را خارج مینمایند و اگر علت خونریزی

نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی) بر میدارند.

اگر پزشک شما ناحیه مشکوکی را یافت، او ممکن است

یک بخش یا همه آن را خارج کند یا به آزمایشگاه

بفرستد. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ

آزمایش میکند، تا سرطان و یا دیگر بیماری های

احتمالی را تشخیص دهد.

مراقبت های بعد از عمل:

قبل از موارد زیر حتما با پزشک خود مشورت

کنید:

۱- انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی

۲- داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی

در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا شش ماه به تاخیر بیندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد حتما تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود. ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید. بعد از کورتاژ لازم است قرص های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت سه ماه برای جبران کم خونی خود استفاده نمایید.