



آموزش به بیمار

خفگی حین زایمان (آسفکسی)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

کلیه نوزادانی که دچار تشنج دوره نوزادی بوده، باید هنگام ترخیص برنامه مناسبی جهت پیگیری تکامل عصبی داشته باشند.

فوق تخصص اعصاب اطفال باید در کنترل تشنج، پیگیری و درمان مشکلات عصبی شیرخوار دچار آسفکسی طرف مشاوره قرار بگیرد.



منبع: www.Clinical key.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۴۵۰

تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی:



رژیم غذایی مجاز و غیر مجاز:

در موارد خفگی ملایم:

در صورت عدم نیاز نوزاد به اکسیژن تغذیه زیر سینه مادر آغاز شود.

در صورت نیاز نوزاد به اکسیژن یا عدم توانایی در تغذیه زیر سینه مادر به هر علت دیگری شیر دوشیده شده مادر توسط لوله تجویز شود.



در موارد آسفکسی متوسط یا شدید:

حداقل به مدت ۴۲ ساعت باید نوزاد اصلاً تغذیه نشود. در نوع شدید بهتر است مدت عدم تغذیه حداقل ۳ روز باشد.

مادران عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای
مراقبت از بیماری نوزادتان می باشد. امیدواریم با
رعایت نکات ذکر شده سلامت نوزاد خود را باز یابید



خفگی زایمانی

رخدادی است ناشی از حوادث پیش از
زایمان، در طی زایمان یا در طی دوره
نوزادی که جنین یا نوزاد دچار کمبود
اکسیژن پیشرونده، و خون رسانی
ناکافی بافت ها و ارگان های بزرگ می
شود.

علائم هشدار دهنده بیماری:

شناسایی حاملگی های پر خطر، مشاوره
با متخصصین زنان و مامایی جهت
مراقبت مناسب تر و تعیین زمان، نوع و
محل زایمان

علائم بیماری:

این علائم در ۳ حالت ملایم، متوسط و
شدید بروزمی
کند و علایم شامل مواردی مانند:

(۱) نوع ملایم: بی قراری، اختلال تحمل
تغذیه و افزایش تحریک بیش از حد،
لرزش، افزایش ترشحات، گیجی و سردرد.
مانند زمانی که ضربه سنگینی به سر
شما خورده باشد

(۲) متوسط: حملات احتمالی قطع تنفس و
تشنج، مانند زمانی که ضربه به سر شما
خورده است و شما بیهوش شده اید.



(۳) شدید: در این نوع خفگی نوزاد
دچار مرگ مغزی میشود. شل و غیر
هوشیار به نظر میرسد، اختلال تغذیه
شدید دارد، تشنج و قطع تنفسات
مکرر دارد و ممکن است در عرض چند
هفته بهبود یافته یا بهبود نیابد.

