



آموزش به بیمار

تشنج



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

۴. مادر زمان اولین ویزیت نوزادش و مراجعه به

پزشک را بداند.

۵. هیچ گاه دارو را بدون مشورت پزشک قطع نکند

و یا مقدار آن را کاهش ندهد.

۶. تشنج با نگهداشتن اندام متوقف نمی شود.



منبع: www.Clinicalkey.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۴۵۰

تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی :



هشدارها:

۱. مادر علائم تشنج مثل حرکات شدید اندامها و

پرشهای عضلانی و حرکاتی شبیه جویدن را بداند.

۲. نحوه استفاده از داروها مورد نیاز در منزل و

نحوه دادن آنها را بداند.

۳. علامتهای بیماری و اینکه چه زمانی با دکتر تماس

بگیرد را بداند.



مادر عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماری نوزادتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت نوزاد خود را بازیابید



تعریف تشنج:

سفت شدن و تکان خوردن ناگهانی

اندامها همراه با کاهش هوشیاری در نوزاد .



علائم و نشانه ها:

انحراف چشم با یا بدون پرش چشم و نگاه خیره
پلک زدن مکرر یا لرزش پلکها خروج آب از دهان
مک زدن یا حرکات دیگر در دهان، گونه، زبان
حملات و حرکاتی مثل پارو زدن در اندامهای فوقانی یا
رکاب زدن در اندام تحتانی



تدابیر درمانی:

درمان در جهت پیشگیری از آسیب مغزی بوده
و شامل:
حمایت تنفسی و قلبی عروقی و رفع فعالیت
تشنجی و دارودرمانی می باشد.
بطور مثال یکی از داروهای ضد تشنج است.
اگر به نوزاد هنگام ترخیص از بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان داروی خاصی داده شود در یک تا سه ماهگی
باید به پزشک مراجعه نماید تا با نظریشک دارو
ادامه و یا قطع گردد.

