



آموزش به بیمار

زردی در نوزاد



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزشی سلامت

عوارض عصبی:

در اثر تجمع بیلی روبین در ساقه ی مغز ایجاد می شود
که منجر به عقب ماندگی ذهنی در نوزادان می گردد.

علائم هشدار دهنده ی بیماری و پیشگیری:

زردی پوست که از چشم ها و صورت شروع می شود و
به شکم و پا ها انتشار می یابد
مراجعه به پزشک ۸۴ ساعت بعد از ترخیص و پس از آن
طبق دستور

منبع: www.Clinicalkey.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۴۵۰

تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی:



رژیم غذایی مجاز و غیر مجاز:

تغذیه با شیر مادر ادامه یابد.

آموزش خود مراقبتی اختصاصی:

نحوه استفاده از دستگاه فتو تراپ احتیاطات گذاشتن و
برداشتن نوزاد از دستگاه
پوشاندن ناحیه ی تناسلی و چشم ها در هنگام فتو تراپی
رعایت نکات کنترل عفونت و بهداشت دست
استفاده از گان و دمپایی مخصوص بخش
آگاهی از عوارض فتو تراپی شامل: مدفوع شل - کم آبی
- گرم و سرد شدن نوزاد
نوزاد با زردی شدید باید از نظر شنوایی بررسی شود .



مادران عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماری نوزادان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت نوزاد خود را بازیابید



ماهیت بیماری:

تغییر رنگ زرد پوست و چشم را گویند که از مسائل شایع دوران نوزادی است. زردی شایع و در اکثر مواقع خوش خیم است درمان نکردن ایکتر شدید با



ضایعات عصبی همراه است. در ۶۰ درصد نوزادان رسیده و در ۸۰ درصد نوزادان نارس بروز می کند.

عوامل مستعد کننده:

۱. دیابت مادر
۲. نارسی
۳. جنس مذکر
۴. کبودی پوست
۵. ارتفاع
۶. تحریک زایمان بادرارو
۷. تاخیر دفع مدفوع
۸. نژاد
۹. پر خونی

۱۰. خونریزی مغزی

۱۱. سابقه ایکتر در فرزند دیگر

۱۲. داروهای مثل ویتامین

۱۳. ناسازگاری خونی

علائم بیماری:

ممکن است در موقع تولد و یا در هر زمان از دوران نوزادی وجود داشته باشد. معمولاً از صورت شروع میشود و به شکم و پاها انتشار می یابد

صورت = ۵

وسط شکم = ۱۵

پاها = ۲۰

روش های تشخیصی:

علامه بالینی مبنی بر زرد رنگ شدن پوست و چشم نوزاد آزمایش خون جهت تعیین سطح بیلی روبین غیرمستقیم خونی



درمان:

فارغ از علت هدف از درمان جلوگیری از سمیت عصبی مربوط به بیلی روبین غیر مستقیم است چرا که در صورت بروز نمی توان این آسیب را برطرف کرد.

فتو تراپی و در صورت عدم موفقیت تعویض خون در نوزادان با وزن بسیار کم فتو تراپی به صورت پیشگیرانه شروع می شود در هنگام فتو تراپی پوشش چشم و دستگاه تناسلی حتماً باید باشد.

