




آمادگی های لازم قبل از انجام آزمایش ها



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی
واحد پاراکلینیک
واحد آموزش سلامت

- ♦ جهت آزمایش ادرار ۲۴ ساعته حتماً از ظرفهای مخصوص که از داروخانه تهیه می نمایند استفاده نمایند.
- ♦ از ساعت ۸ صبح اولین ادرار را دور ریخته و تمامی ادرار خود را تا ساعت ۸ صبح فردا در داخل ظرف مخصوص ریخته و سریعاً به آزمایشگاه منتقل کنید.
- ♦ در طول زمان جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته ظرف را در مکان خنک و یا کنار یخ نگهداری کنید
- ♦ پیش از انجام آزمایش از مصرف مایعات زیاد و ورزش خودداری نمایند.
- ♦ نام و نام خانوادگی و وزن خود را روی ظرف یادداشت

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ۰۵۱۳۵۰۷۲۲۵۳
بخش آزمایشگاه تماس بگیرید.



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی :



دستورالعمل جمع آوری نمونه کشت ادرار در

بزرگسالان:

- ♦ بهتر است نمونه ادرار صبحگاهی باشد.
- ♦ آلت تناسلی خود را کاملاً با آب (بهرتر است در خانم ها با آب و صابون) شسته و خشک نمائید.
- ♦ ظرف کشت استریل می باشد لذا به هیچ عنوان نباید دستها با جدار داخلی ظرف تماس پیدا کند.
- ♦ وسط ادرار مورد نیاز است، بنابراین مقدار کمی از قسمت اول ادرار را داخل توالت تخلیه و از وسط ادرار را داخل ظرف بریزید. (تا نصف ظرف پر شود کافی است).
- ♦ در مورد کشت ادرار، در صورت مصرف آنتی بیوتیک، باید ۷۲ ساعت از مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد.
- ♦ درب ظرف را به طور کامل بسته و به آزمایشگاه تحویل دهید.

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار ۲۴ ساعته

- ♦ این نمونه برای تشخیص بسیاری از بیماریها خصوصاً بیماریهای کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد و باید طی ۲۴ ساعت جمع آوری گردد. نمونه باید در ظروف تمیز و استفاده نشده جمع آوری گردد.

مراجعه کننده عزیز :

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای انجام آزمایش صحیح از شما مراجعه کننده محترم می باشد. لذا با دقت این پمفلت را مطالعه کنید.



♦ پذیرش آزمایشگاه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰

♦ جوابدهی از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ می باشد

♦ در نتیجه خواهشمند است خارج از ساعات یاد شده به علت تداخل با آزمایشهای بیماران بستری مراجعه نفرمایید .

♦ پس از نمونه گیری یک رسید به شما تحویل داده می شود که بسته به نوع آزمایش شما تاریخ جوابدهی بر روی آن قید گردیده است .

♦ در صورتیکه آزمایش شما نیاز به تکرار داشته باشد مجدداً از شما خونگیری خواهد شد.

♦ آزمایشگاه روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشد.

♦ جهت آزمایشهای بیوشیمی و خصوصاً چربی خون ۱۲-۱۴ ساعت ناشتایی لازم است .

♦ جهت آزمایشهای هورمونی ترجیحاً ۴-۸ ساعت ناشتایی بهتر است.

♦ جهت آزمایش قند خون ناشتا ۸-۱۰ ساعت ناشتایی لازم است.

♦ جمع آوری نمونه مدفوع

♦ کاربرد این آزمایش برای تشخیص انواع مختلف انگل های بیماریزا در مدفوع است.

♦ در سه نوبت و سه روز متوالی انجام شود.

♦ احتیاج به ناشتا ندارد.

♦ از بخش بلغمی یا خونی مدفوع داخل قوطی ریخته شود.

♦ جهت آزمایش GTT: پس از گرفتن نمونه قند ناشتایی

پودر گلوکز به شما داده می شود که باید در آب حل شده و زیر ۵ دقیقه میل شود و پس از آن در سه نوبت یک ساعته از شما نمونه گیری خواهد شد.

♦ در صورت بالا آوردن (استفراغ) محلول گلوکز زیر ۳۰ دقیقه به نمونه گیری اطلاع داده شود زیرا آزمایش باید مجدداً تکرار شود. و در مدت سه ساعت زمان نمونه گیری جدا از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

♦ جهت آزمایش GCT: نیاز به ناشتایی ندارد و پس از یک ساعت از خوردن پودر گلوکز از شما نمونه گیری خواهد شد.

♦ قند ۲ ساعته (2HPP): ناشتایی لازم دارد و پس از

نمونه گیری قند ناشتا، صبحانه روزانه زیر ۱۰ دقیقه میل شود و پس از ۲ ساعت از خوردن صبحانه نیز نمونه گیری صورت می گیرد.

♦ آزمایش خون مخفی مدفوع

♦ ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن مواد ذیل خودداری نمائید:

♦ گوشت قرمز و سفید، جگر، ماهی

♦ سبزیجات، شلغم، تربچه

♦ قطره و قرص آهن

♦ داروهای دارای ویتامین C، داروهای ایندومتاسین، آسپرین، ایبوپروفن، کورتونها

♦ نمونه گیری (کشت) ادرار از اطفال

♦ بهتر است قبل از نمونه گیری کودک را استحمام نمائید.

♦ محل خروج ادرار کاملاً با آب و صابون شسته شده، سپس با آب معمولی کاملاً شستشو داده و خشک شود.

♦ کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه، باز کرده و بطور پاکیزه روی محل قرار داده شود.

♦ هر کیسه ادراری حداکثر ۴۵ دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد.

♦ حدود ۱۵-۱۰ سی سی ادرار در کیسه جمع شده، سرکیسه بسته شود.

♦ بعد از جمع آوری ادرار آن را سریع به آزمایشگاه برسانید و در غیر این صورت آن را در یخچال گذاشته و حداکثر

ظرف ۶ ساعت آن را به آزمایشگاه برسانید.

♦ روی کیسه حتماً نام و نوع آزمایش قید شده باشد.