



آموزش به بیمار

راهنمای مصرف دارو ها در کرونا



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزشی سلامت

هر ۶ ساعت و ناپروکسن ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت استفاده شود.

توجه کنید داروهای مسکن فقط در حد لازم و در کمترین دوز موثر استفاده شود. قرص ناپروکسن بعد از غذا و با معده پر استفاده شود.



رقیق کننده های خون:

رقیق کننده های خونی، داروهای هستند که از تشکیل لخته های مضر خونی پیشگیری می کنند. با این حال، ممکن است اثرات ناخواسته ای مانند خونریزی ایجاد کنند. معمولاً برای

افرادی که برای اولین بار با COVID-19 در بیمارستان بستری می شوند، رقیق کننده های خونی تجویز می شود.

داروهای رقیق کننده خون و ضد انعقاد نظیر آسپرین و آکسابین انکزاپیرین فقط با تجویز پزشک مصرف شوند. برای کنترل با دستور پزشک از دیفن هیدرامین و کلردیازپوکساید استفاده کنید.


نکته : داشتن استراحت کافی و تغذیه کامل و مقوی و مصرف مایعات فراوان مهمترین اصل در درمان بیماران کرونا می باشد



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی :



ضدتیهوع واستفراغ : علائم



گوارشی کرونا خفیف (دردهای شکمی، اسهال و استفراغ) در مدت زمان کوتاهی بهبود پیدا می کنند. افراد با علائم حاد

گوارشی، حجم بیشتری از ویروس در بدنشان وجود دارد. همچنین احتمال انتقال بیماری از طریق مدفوع در این افراد بیشتر است.

برای بهبود تیهوع واستفراغ از شربت پرومتازین و قرص دیمن هیدرینات و دیفن هیدرامین می توان استفاده کرد.

برای کنترل اسهال باید



مایعات و الکترولیت های از دست رفته بدن جبران شود و

از قرص لوپرامید می توان استفاده نمود.

جهت کاهش اسید معده و مشکلات گوارشی از فاموتیدین و

پنتاپرازول می توان استفاده



کرد.

تب بر وضد دردها:

در صورت تب و بدن درد از استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم

مددجوی عزیز : سلام

هموطن گرامی تاکید میکنیم که تا کنون هیچ داروی معتبر و موثری در درمان بیماری کوید۱۹ در دنیا معرفی نشده است.

بهترین راه مقابله با این بیماری، رعایت رفتار های بهداشتی،

شستشوی دست ها به روش صحیح، استفاده از ماسک و

اجتناب از حضور در اجتماعات و دورهمی ها می باشد.

داروهای زیر فقط نتایج تحقیقات دانشمندان در این زمینه می باشد.

توجه کنید مصرف هرگونه دارو باید تحت نظر پزشک صورت گیرد مراجعه به موقع از عوامل مهم در درمان این بیماری است.

۱- رمدسیویر: یک داروی ضد ویروس جدید که این دارو از تولید مثل ویروس عامل کرونا پیشگیری میکند. تاکنون هیچ دارویی برای درمان قطعی کرونا وجود نداشته اما برخی داروها مثل رمدسیویر جهت درمان بیماران حاد استفاده میشود که بصورت پودری است که با مایع مخلوط شده و محلول بدست آمده به آرامی تزریق میشود طول مدت تزریق ۳۰ تا ۱۲۰ دقیقه می باشد و بصورت یک بار در روز به مدت ۵ روز متوالی تزریق میشود. طول درمان بستگی به میزان واکنش بدن به دارو دارد.



در صورت مشاهده هر کدام
از علائم زیر به پزشک یا
پرستار خود اطلاع دهید.

علائم گوارشی (تهوع- استفراغ- کرامپهای شکمی- بی اشتها)

لرز- تعریق- سرگیجه هنگام ایستادن- خس خس سینه یا تنگی نفس- ضربان قلب غیر طبیعی سریع یا کند- بثورات پوستی- تورم صورت و گلو و لبها

احتیاطات هنگام مصرف داروی رمدسیویر

۱- در صورت ابتلا به بیماری کبدی یا کلیه به پزشک اطلاع دهید و کنترل روزانه آنزیمهای کبدی و آزمایشات کلیه انجام شود.

۲- در صورت بارداری و شیردهی



فاوپیپراویر: این دارو برای

درمان بیماری های ویروسی مورد استفاده قرار می گیرد.

بصورت قرص خوراکی ۲۰۰

میلی گرمی تولید شده است استفاده از فاوپیپراویر در بارداری ممنوع است زیرا ممکن است باعث آسیب به جنین شود.

مصرف فاوپیپراویر برای کودکان توصیه نمی شود.

نحوه تجویز فاوپیپراویر برای بیماران کرونا

فاوپیپراویر باید به صورت خوراکی تقریباً هر روز در یک زمان

به همراه یا بدون غذا مصرف شود. قرص فاوپیپراویر

باید کامل با آب بلعیده شود. قرص نباید باز، شکسته یا جویده شود.

برای بیماران مبتلا به کووید-۱۹، دوز معمول فاوپیپراویر برای بزرگسالان ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی گرم خوراکی دو بار در روز (۹ تا ۶ قرص) در روز اول و به دنبال آن ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم (۳ تا ۴ قرص) خوراکی دو بار در روز و به مدت ۷ تا ۱۴ روز.

عوارض فاوپیپراویر

گوارشی: کاهش اشتها، اسهال، تهوع، استفراغ

افزایش اوریک اسید خون- عوارض پوستی- درد عضلانی- حمله آسم- نورم در سراسر بدن

کبدی: آسیب کبدی، افزایش آنزیمهای کبد

خدسرفه ها :

سرکوب کننده های سرفه : که

منجر به مهار سرفه می شوند .

خلط آورها : خلط را شل می

کنند و با سرفه خلط از مجاری هوایی راحتتر بیرون می آید. مثل

شربت دیفن هیدرامین دکسترومتورفان- و برم هگزین

خواب آلودگی و گیجی از عوارض این دارو ها هستند