



آموزش به بیمار

آمادگی های لازم برای تصویربرداری



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

واحد پاراکلینیک

واحد آموزش سلامت

۵. ۲ عدد آمپول مگلو مین ۲۰ سی سی در ۱/۵ لیتر آب حل شود. بیمار سه چهارم محلول را به مدت ۵۰ دقیقه به صورت متناوب تا زمان انجام آزمون میل کند و یک چهارم باقی مانده در زمان انجام آزمون مصرف می شود.

آمادگی های لازم جهت انجام سونوگرافی در
هنگام رویت و پذیرش نسخه، به بیمار
آموزش داده می شود.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفاً با شماره:
۳۵۰۷۲۲۶۱ رادیولوژی و سونوگرافی
تماس بگیرید



با ما همراه باشید در سایت بیمارستان شریعتی:



۷. روز انجام آزمون کاملاً ناشتا باشد. خوردن

داروهای ضروری و نوشیدن آب بلامانع است.

سی تی اسکن شکم با کنتراست

خوراکی و وریدی

۱. ۲۴ ساعت قبل غذای جامد و نفخ میل نشود.

۲. شام ساعت ۲۰ شب قبل از مراجعه سوپ صاف شده میل شود.

۳. روغن کرچک ۴۰ گرمی یا داروی مشابه به دستور پزشک داروخانه ساعت ۲۱ میل شود.

۴. ۶ عدد قرص دایمتیکون به صورت دو عدد ساعت ۱۸ و دو عدد ساعت ۲۱ شب قبل از مراجعه و دو عدد ساعت ۶ صبح روز مراجعه مصرف شود.

مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیمارستان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



پذیرش رادیولوژی و سی تی اسکن: از ۷:۳۰ الی ۲۴

پذیرش سونوگرافی: از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ (بجز روزهای تعطیل)

انواع گرافی های ساده و اختصاصی، انواع سی تی اسکن بدون تزریق و با تزریق خوراکی، سونوگرافی های روتین و کالر داپلر در این مرکز قابل انجام است.

در صورت بارداری یا شک به آن حتما به پرسنل پذیرش یا کارشناس رادیولوژی اطلاع داده شود. داشتن همراهی برای انجام گرافی های اختصاصی الزامی است.

آزمون های رادیوگرافی ترانزیت

شما باید: ۱. شام ساعت ۲۰ شب قبل مراجعه غذای مختصر میل نماید

۲. ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمون رادیوگرافی ناشتا باشد. ساعت ۲۱ شب قبل مراجعه یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی یا داروی مشابه به دستور پزشک داروخانه میل شود. ۳. در صورتی که عمل جراحی مربوط به روده، مری و معده انجام داده اید، به مسئول پذیرش اطلاع دهید. ۴. لباس راحتی بدون دکمه و زیپ و دیگر چیزهای حاجب (هر چیز فلزی یا پلاستیکی) به همراه داشته باشد.

۵. سه بسته پودر سولفات باریم از داروخانه تهیه و به همراه داشته باشد.

۶. خوردن داروهای ضروری و نوشیدن آب بلامانع است.

آزمون رادیوگرافی LS و KUB

شما باید: ۱. بیمار ساعت ۲۰ شب قبل از مراجعه شام سوپ صاف شده میل نماید.

۲. ساعت ۲۱ شب قبل از انجام آزمون یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی یا داروی مشابه به دستور پزشک داروخانه میل نماید.

۳. دو عدد قرص بیزاکودیل را ساعت ۲۳ شب میل نماید.

۴. خوردن داروهای ضروری و نوشیدن آب بلامانع است.

۵. استعمال دخانیات نکند و خوردن نوشابه ممنوع است. ۶. لباس راحتی بدون دکمه و زیپ و دیگر چیزهای حاجب(هر چیز فلزی یا پلاستیکی) به همراه داشته باشد. ۷. روز انجام آزمون کاملا ناشتا باشد.

آزمون رادیوگرافی IVP

شما باید: ۱. بیمار ساعت ۲۰ شب قبل از مراجعه شام سوپ صاف شده میل نماید.

۲. ساعت ۲۱ شب قبل از انجام آزمون یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی یا داروی مشابه به دستور پزشک داروخانه میل نماید.

۳. دو عدد قرص بیزاکودیل را ساعت ۲۳ میل نماید.

۴. ۶ عدد قرص دایمتیکون به صورت دو عدد ساعت ۱۸ و دو عدد ساعت ۲۱ شب قبل از مراجعه و دو عدد ساعت ۶ صبح روز مراجعه مصرف شود.

۵. استعمال دخانیات نکند و خوردن نوشابه ممنوع است.

۶. لباس راحتی بدون دکمه و زیپ و دیگر چیزهای حاجب (هر چیز فلزی یا پلاستیکی) به همراه داشته باشد.