



آموزش به بیمار

مجرای شریانی باز (PDA)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت

- زمانی که محل عمل قفسه سینه کودک درد دارد و یا خونریزی از بینی دارد و یا هر گونه ورم و کودی را به جراح اطلاع دهید.

- تب کودک حتی تا یکماه پس از جراحی را جدی بگیرید.

اگر کودک شما دچار تنگی نفس و نیز سرفه های پایدار و مکرر شد حتماً به پزشک مراجعه کنید.

- حالت تهوع و استفراغ و دل درد را حتماً اطلاع دهید و اگر پاهای کودک شما سرد و رنگ پریده شد و یا درد قفسه سینه احساس کرد به پزشک مراجعه کنید.

منبع: www.uptodate.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ، می توانید با کلینیک پرستاری
آموزش سلامت از ساعت ۱۳-۸ تماس حاصل فرمایید .
۰۵۱۳۵۰۷۲۱۷۱



برای اطلاعات بیشتر با تلفن همراه بارکد زیر را اسکن کنید.



درمان:

درمانهای مجرای شریانی باز به سن فرد در شروع درمان بستگی دارد.

عوارض:

افزایش فشارخون ریوی، نارسایی قلبی، عفونت قلبی

مراقبت در منزل:

مصرف داروهایی که بعد از عمل به شما داده می شود باید به موقع و سر وقت مصرف کنید. دقت کنید که محدود کردن یکی از مهم ترین عوامل بهبود کودک شماست. زمان مصرف قطع آنتی بیوتیکها حتماً از پزشک جراح کودکان سؤال کنید و طبق آن پیش بروید، شروع برگشت کودک شما به مدرسه فقط زمانی می تواند باشد که به سلامتی کامل دست پیدا کند.

- گریه و بی تابي کودکتون را کنترل کنید و نگذارید به مدت طولانی گریه کند. پانسمان را می توانید در منزل از روی زخم بردارید و لباس نازک و تمیز به کودکتون بپوشانید، دستهای کودک را به هیچ عنوان نکشید.



عوامل ایجاد کننده وعوامل خطر:

نقایص قلبی مادرزادی ناشی از مشکلاتی است که در زمان تشکیل و تکامل قلب رخ می دهد که معمولاً علت مشخصی ندارد ژنتیک و فاکتورهای محیطی در این زمینه نقش دارد.

تشخیص:

از طریق اکوکاردیوگرام، عکس برداری از قفسه سینه با اشعه ایکس اکترکاریوگرام و آنژیوگرافی قلبی می باشد.



علائم:

علائم مجرای شریانی باز بسته به اندازه حفره و این که نوزاد نا رس بوده یا خیر؟ متفاوت است، حفره کوچک می تواند بدون علامت بوده و مدتها و حتی تا دوران بزرگسالی ناشناخته باقی بماند. اما شریان های بزرگ می تواند علامت نارسایی قلبی را بلافاصله پس از تولد نشان دهد.

حفره شریانی باز بزرگ که در ابتدای نوزادی مشخص می شود می تواند منجر به این موارد گردد.

1. ناتوانی در تغذیه که منجر به رشد نامناسب می شود .
2. تعریق در زمان گریه کردن یا غذا خوردن
3. نقص سریع یا کوتاه شدن تنفس
4. خستگی سریع
5. ضربان قلب تند

مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



تعریف:

مجرای شریانی باز وجود یک رگ اضافی در بین دو رگ وارد شونده، به قلب است. این رگ را حفره شریانی می نامند که در بدو تولد بصورت طبیعی در سیستم گردش خون نوزاد دیده می شود. و مدت کوتاهی پس از تولد بسته می شود. اگر این حفره باز باقی بماند به آن مجرای شریانی باز می گویند.

