



آموزش به بیمار

نقص در دیواره ی بین بطنی (VSD)



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزش سلامت



مراقبت در منزل:

- فعالیت های شدید و طولانی را محدود کنید اما بعد از بهبودی کامل می تواند.

- فعالیتهای روزانه را انجام دهد.

- در مورد مراقبت از زخم بعد از عمل باید محل زخم تمیز و خشک باشد.

- نظافت دهان و دندان کودک و نیز مسواک زدن مناسب می تواند در کاهش عفونت دیوار قلب پس از عمل جراحی مؤثر باشد.

منبع: www.uptodate.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ، می توانید با کلینیک پرستاری

آموزش سلامت از ساعت ۱۳-۸ تماس حاصل فرمایید .

۰۵۱۳۵۰۷۲۱۷۱



برای اطلاعات بیشتر با تلفن همراه بارکد زیر را اسکن کنید.



درمان:

بستگی به سن کودک و نیز اندازه حفره دارد که گاهی با دارو درمانی، سوراخ بسته می شود و در غیر این صورت و در شرایطی که سوراخ بین دو بطن بزرگ باشد. نیاز به عمل جراحی دارد.

- مناسب ترین زمان برای جراحی قلب در کودکان کمتر از ۲ سالگی می باشد در سینه های بالاتر احتمال عفونت در قلب زیاد می شود که از شش ماه قبل از عمل باید آنتی بیوتیک به کودک داده شود و نیز ویزیت دندان پزشک نیز انجام شود.


مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



تعریف بیماری:

وجود یک حفره در دیواره بین دوطبق چپ و راست قلب را نقص دیواره ی بین بطنی میگویند. این یکی از شایعترین بیماریهای قلبی مادرزادی در نوزادان می باشد.



علائم:

بستگی به اندازه سوراخ بین بطنهای قلب دارد، در مواردی که سوراخ بزرگ باشد در هفته های اول پس از تولد نوزاد علائمی نظیر تنفسهای سطحی و کوتاه، بی اشتها و وزن نگرگفتن نوزاد را به همراه دارد.

علائمی نظیر تب، کاهش وزن ناگهانی پس از بهبود وزن کودک نیاز به ویزیت پزشک و پیگیری جدی از طرف شما دارد.

عوامل ایجاد کننده و عوامل خطر:

بیماری شایع قلبی است که علت آن در بیشتر مواقع مشخص نیست.

- مواردی نظیر سابقه فامیلی، مصرف الکل در دوران بارداری، دیابت مادر در دوران بارداری می توانند خطر بروز این بیماری را در کودک بیشتر کنند.



تشخیص:

در سمع قلبی کودک صدای نابجا شنیده می شود و نوار قلب، عکس قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی جهت تشخیص بیماری انجام می شود.