




آموزش به بیمار

تومور بافت مخاطی MYXOMA



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری
 واحد آموزشی سلامت

تشخیص:

آزمایش خون

در آزمایش خون، سطوح چربی ها، آنزیم های قلبی و محتوای اکسیژن نشان داده می شود.

تصویر برداری

تصویربرداری از قفسه سینه، به روش های سی تی اسکن و ام آر آی، انجام می شود

اکوکاردیوگرافی

اصلی ترین روش تشخیصی برای شناسایی این عارضه است.

توموگرافی

الگوی حرارتی سطح بدن را به صورت تصویربرداری توسط اشعه مادون قرمز، نشان می دهد.

درمان:

برای درمان تمامی تومورهای اولیه قلبی از جمله تومور بافت مخاطی از روش جراحی باز استفاده می شود. در این جراحی، پزشک متخصص قلب و عروق با همکاری فوق تخصص جراحی قلب و عروق با بررسی نتایج تمامی تست های انجام شده، اقدام به خارج کردن تومور قلبی می کند.

منبع: www.uptodate.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، می توانید با کلینیک پرستاری

آموزش سلامت از ساعت ۱۳-۸ تماس حاصل فرمایید.

۰۵۱۳۵۰۷۲۱۷۱



لطفاً بار کد فوق را اسکن کنید.



علائم:

• عمومی مانند تب و لرز، ضعف و خستگی، درد مفاصل و

کاهش وزن

• تپش قلب و احساس ضربان قلب

• درد در قفسه سینه

• تنگی نفس در فعالیت هایی مانند ورزش کردن و بالا رفتن


از پله

• اختلال تنفس به هنگام خوابیدن یا دراز کشیدن به پشت

• تنگی دریچه میترال و ایجاد سرفه های مکرر

• تغییر شکل ناخن ها و بزرگ شدن بافت انگشتان

• آمبولی و اختلال در مسیر خونرسانی




مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیمارتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



به رشد غیرطبیعی بافت قلبی، تومور قلبی گفته می شود. تومورهای قلبی می توانند به صورت غیر سرطانی (خوش خیم) یا سرطانی (بدخیم) رشد کنند. یکی از شایع ترین تومورهای قلبی با نام تومور میگزوم قلبی شناخته می شود. این نوع تومور قلبی به دلایل مختلفی در بدن شخص ظاهر می شود و علائم آن می تواند با علامت یا بدون علامت باشند.



تومور بافت مخاطی قلبی چیست؟

میگزوما (میکسوم) و به انگلیسی (Myxoma) یا تومور بافت مخاطی، از شایع ترین تومورهای قلبی است. به طوری که از هر ۴ بیماری که مبتلا به تومور قلبی هستند، ۳ بیمار آن، با تومور قلبی از نوع میگزوم درگیر هستند. این تومور به صورت خوش خیم و غیرسرطانی در قلب رشد می کند. اگر بخواهیم تومورهای قلبی را در دو دسته تومورهای قلبی اولیه و ثانویه دسته بندی کنیم؛ تومور قلبی میگزوم، در بین تومورهای قلبی اولیه جای می گیرد. میگزوم قلبی بیشتر در گروه سنی بزرگسال بین ۲۰ تا ۷۰ سال مشاهده می شود و اغلب در دهلیز چپ قلب رشد می کند. در موارد بسیار استثنایی، میگزوم در دهلیز راست نیز ظاهر می شود. این نوع تومور در زنان شیوع بیشتری نسبت به مردان دارد.

علت های بروز تومور بافت مخاطی قلبی!

علت یا علت های میگزوم قلبی تا به حال مشخص نشده است. دانشمندان و محققان توده شناسی، ماهیت ژنتیکی را یکی از علت های احتمالی این عارضه پیش بینی می کنند. به طوری که ۹۰ درصد این بیماری علت های مختلف و فقط ۱۰ درصد آن علت ژنتیکی دارد. پس تنها ۱۰ درصد میگزوم ها مانند سندرم کارنی، دلیل وراثتی دارند. بنابراین در صورتی که یکی از اعضای خانواده با مشکل میگزوم قلبی درگیر باشد، لازم است دیگر اعضای خانواده تست غربالگری انجام دهند.

چگونه می توان از تومور بافت مخاطی قلبی

پیشگیری کرد؟

برای افرادی که در بین اعضای خانواده خود، شخصی مبتلا به بیماری میگزوم قلبی است، احتیاط و مراقبت بیشتری لازم است. این افراد باید از کشیدن سیگار اجتناب کنند و به هیچ عنوان از تنباکو استفاده نکنند. همچنین نوشیدن الکل و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش خورشید، توصیه نمی شود.