



عنوان : خونریزی معده

بخش تهیه کننده : داخلی

واحد آموزش سلامت

بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

توضیح در خصوص بیماری :

زمانی که خونریزی زخم شروع میشود خون اسید معده ی موجود در اطراف زخم را خنثی میکند و در نتیجه اسید خنثی شده ناحیه های حساس نزدیک زخم را نمیسوزاند پیامد این واکنش متوقف شدن احساس درد و بروز مشکلات جدی و وخیم است
بیمار گاهی دچار خونریزی معده بدون درد و کم خونی میشود گاهی به دلیل از دست دادن خون دچار سرگیجه میشود

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



عنوان بیماری: خونریزی معده

علت بیماری:

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



التهاب مری وریفلاکس معده به مری
واریس (رگ های غیرطبیعی بزرگی که معمولاً در انتهای مری یا معده فوقانی قرار دارند)
پارگی مالوری-واریس: معمولاً در اثر استفراغ شدید ایجاد میشود
ورم معده (التهاب معده)

سرطان معده

زخم ها

سایر موارد: افرادی که دچار سوختگی - شوک - صدمات سریا سرطان و کسانی که جراحی
بزرگی داشته اند ممکن است به زخم معده مربوط به استرس مبتلا شوند و خونریزی معده
وقوع پیدا کند.

عنوان بیماری: خونریزی معده

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



علائم بیماری:

از علایم خونریزی معده که در آزمایشات اختصاصی مربوط به مدفوع تشخیص داده میشود این نوع خونریزی بیشتر با علایمی نظیر کاهش وزن و کم خونی مزمن همراه است. مدفوع قیری و بدبو: که ملانانام دارد.

استفراغ خون روشن: همراه با موادی بازمینه قهوه ای یکی از نشانه های خونریزی میباشد.

وجود خون قرمز روشن در مدفوع: مربوط به خون ریزی قسمت تحتانی گوارش

علایم شوک و افت فشار خون: یکی از نشانه های از دست دادن شدید خون

علایمی مثل افزایش ضربان قلب (تاکیکاردی)- تعریق- سبکی سر- رنگ پریدگی و تهوع نیز در اثر از دست دادن خون ممکن است ایجاد گردد.

عنوان بیماری: خونریزی معده

تشخیص:

آندوسکوپی (روشی است شامل استفاده از یک دوربین کوچک واقع در بالای لوله آندوسکوپی طولانی و انعطاف پذیر است که پزشک آن را در گلو قرار میدهد تا منبع خونریزی را تشخیص دهد) مثبت بودن تست خون مخفی

افت هموگلوبین

آتریوگرافی ممکن است موضع خونریزی را تایید کند

اسکن خونریزی نشانگر موضع خونریزی که با استفاده از گلوبول قرمز نشاندار انجام میشود آنمی (کمبود آهن) در خونریزی کند و مزمن

معاینه آنتروسکوپی

کولونوسکوپی (برای تعیین علت خونریزی گوارش پایین)

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



عنوان بیماری: خونریزی معده

درمان:

مصرف انتی بیوتیک برای از بین بردن هلیکوباکتریلوری

داروهای متوقف کننده تولید اسید و تسریع کننده التیام زخم (امپرازول - پنتوپرازول ۰۰۰)

داروهای کاهش دهنده تولید اسید یا متوقف کننده های هیستامین (فاموتیدین - سایمیتیدین)
ضد اسیدهای خنثی کننده اسید معده

داروهای محافظت کننده مخاط معده و روده کوچک (بیسموث)
رژیم غذایی سالم: سرشار از سبزی و غلات مفید است
مدیریت استرس و فشار روانی
عدم استعمال دخانیات

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



عنوان بیماری: خونریزی معده

پرستاری در منزل:

افرادی که دچار خونریزی معده شده اند نیاز به پایش دقیق دارند چراکه خطر شوک در اثر خونریزی در افرادی که خون زیادی از دست داده بسیار زیاد است
از خوردن غذاهایی که باعث تشدید زخم میشود خودداری کنند غذاهای سرخ کردنی - چرب - پرادویه - تند باید کاهش یابد و استفاده نشود
از مصرف الکل و دخانیات خودداری شود و بیشتر از غذاهایی که به سیستم خونی افراد کمک میکند مثل جگر حبوبت به خصوص عدس و گوشت قرمز استفاده شود
در صورت وجود خونریزی غیر معمول به پزشک مراجعه شود.

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



عنوان بیماری: خونریزی معده