



آموزش به بیمار

تداخلات دارویی و غذایی بخش داخلی



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی
مدیریت پرستاری
واحد آموزش سلامت

آنتی هیستامین ها با گریپ فروت : افزایش یا

کاهش اثر دارو می شود

سبزیجات برگ سبز با وارفارین : باعث کاهش اثر

وارفارین می شود

لبنیات با سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین :

مانع جذب این داروها می شود

الکل باعث افزایش یا کاهش دوز

همه داروها می شود.

منبع: www.uptodate.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ، می توانید با کلینیک پرستاری

آموزش سلامت از ساعت ۱۳-۸ تماس حاصل فرمایید .

۰۵۱۳۵۰۷۲۱۷۱



برای اطلاعات بیشتر با تلفن همراه بارکد زیر را اسکن کنید.



وارفارین با اسویکس : افزایش ریسک

خونریزی

لوزارتان با سایمتیدین: افزایش جذب

لوزارتان

فوروزماید با داروهای فشارخون : خطر

افت فشار خون را بالا می برد

فوروزماید با انسولین و داروهای کاهنده

قند خون: اثر انسولین و داروهای کاهنده

خون را کم می کند

تداخل دارو با غذا

گریپ فروت باعث افزایش جذب

آتروستاتین و داروهای فشارخون

می شود.

تداخلات دارویی

منظور از تداخلات دارویی این است که مصرف همزمان یک دارو با سایر دارو ها / غذا ها می تواند اثر آن را در بدن تغییر دهد به عبارت دیگر اثربخشی دارو را از آنچه مورد انتظار است کم یا زیاد کند و منجر به بروز عارضه شود

انواع تداخلات دارویی:

۱- تداخل دارو با داروی دیگر

۲- تداخل دارو با غذا

۳- تداخل دارو با بیماری

پنتوپرازول با کتوکونازول و آمپی سیلین :

کاهش جذب دارو پنتوپرازول

اسید فولیک با فنی توئین و فنوباریتال:

غلظت فنی توئین و فنوباریتال را کم میکند

اسید فولیک با سولفاسالازین : جذب

اسید فولیک را کم می کند

هالوپریدول با فنوباریتال و سایمتیدین :

اثر هالوپریدول را کم می کند

هیدروکورتیزون با انسولین و داروهای

کاهنده ی قند خون:

اثر داروهای کاهنده قند

قند خون را کاهش می دهد

لووتیروکسین با دیگوکسین: اثر

دیگوکسین را کم می کند

لووتیروکسین با انسولین و داروهای کاهنده

خون:

اثر داروهای کاهنده خون را کم می کند

آتوروستاتین با انتی اسید : کاهش

غلظت اتوروستاتین

آزیترومایسین با تئوفیلین : افزایش

اثر تئوفیلین

ازیترومایسین با دیگوکسین :

افزایش سطح سرمی دیگوکسین و

مسمومیت با آن