

عنوان :
کورٹاژ

بخش تهیه کننده :
جراحی عمومی



بیمارستان فوق تخصصی دکتر شریعتی مشهد

واحد آموزش سلامت

بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل

کورتاژ:

کورتاژ در کلمه یعنی تراشیدن و خارج کردن قسمتی از بافت بدن. بنابراین برای هر قسمتی از بدن که نیاز به خارج کردن بافت یا نمونه داشته باشید ممکن است انجام شود. در گفتار مصطلح این کلمه در واقع خالصة فارسی شده Curettage and Dilation یا C&D است که به معنی اتساع و بیرون آوردن جنین یا بافت داخلی رحم است . کورتاژ ممکن است به منظور درمان یا تشخیص بیماری رحم انجام شود و تنها یکی از موارد استفاده آن خارج کردن جنین زنده و سقط عمدی است. روشهای مختلفی برای انجام این کار وجود دارد مانند ساکشن یا کورت



ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



علت کورتاژ:

- هنگام بروز خون ریزی های غیر طبیعی از رحم
- در موارد شک به باقی ماندن جفت در رحم به دنبال زایمان و سقط
- پولیپ و فیبروم های رحمی
- شک به سرطان یا ضایعات پیش سرطانی رحم
- خونریزی بعد از یائسگی
- حاملگی خارج رحمی
- بررسی اختلالات رحم
- در هر موردی که نیاز به نمونه برداری از رحم باشد و عمل بیوپسی امکان پذیر نباشد

عوارض کورتاژ:

- سوراخ شدن رحم و عفونت از مهمترین عوارض کورتاژ هستند
- چسبندگی در رحم
- تشکیل لخته خون به علت عدم تحرک بیمار

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



تشخیص:

کورتاژ تشخیصی خارج کردن محتویات رحم یا بقایای محتویات است و با هدف بررسی نمونه به دست آمده و تشخیص ضایعه در رحم انجام می شود .
این عمل معمولاً پس از سقط هایی انجام می شود که در سه ماهه اول اتفاق افتاده اند. در کورتاژ تشخیصی مانند (C&D) هر دو کار انجام می شود: باز کردن دهانه رحم و برداشتن محتویات رحم.
در ۵۵ درصد سقط هائی که قبل از هفته دهم حاملگی اتفاق می افتند معمولاً محتویات رحم بدون مشکل خاصی خارج می شود. اما در سقط های پس از هفته دهم معمولاً تمام اجزا حاملگی خارج نمی شوند و الزم است توسط پزشک بیرون آورده شوند .
در برخی موارد که لکه بینی یا سایر مشکلات در پی سقط وجود دارد نیز برای بررسی وضعیت داخل رحم انجام می شود

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل



مراقبت پرستاری در منزل:

- مصرف منظم داروهای تجویز شده جهت پیشگیری از عفونت و کاهش درد
- تا پایان دوره ی نقاهت نباید رانندگی کنید
- به مدت یک هفته نباید کار های سنگین یا فعالیت های ورزشی شدید انجام دهید.
- از تامپون یادوش واژینال نباید استفاده کنید
- در صورتی که حالت تهوع دارید از غذاهای کم چرب استفاده کنید
- نباید دوچرخه سواری کنید
- تا زمانی که کاملاً بهبود نیافته اید از برقراری رابطه جنسی اجتناب کنید.

ماهیت بیماری

علت بیماری

علائم بیماری

تشخیص

درمان

پرستاری در منزل

