




آموزش به بیمار

هیپاتیت دارویی



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزشی سلامت

مراقبت در منزل

- مصرف روزانه حداقل ۸ لیوان مایعات در طول درمان و جلوگیری از هیپاتیت دارویی موثر است.
- داروهای دیگر تا حد امکان استفاده نشود حتی استامینوفن و
- مصرف رژیم غذایی پرپروتئین مانند گوشت و سبزیجات و تخم مرغ و ...



منبع: www.uptodate.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، می توانید با کلینیک پرستاری آموزش سلامت از ساعت ۱۳-۸ تماس حاصل فرمایید.

۰۵۱۳۵۰۷۲۱۷۱



برای اطلاعات بیشتر با تلفن همراه بارکد زیر را اسکن کنید.



درمان

طبق دستور پزشک داروهای ضد سل متوقف می شود و تا زمان نرمال شدن آزمایشهای کبدی روند درمان تغییر پیدا میکند.



مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



هیأتیت دارویی

وقتی که شما در حال استفاده روزانه داروهای سل هستید و عوارض ناخواسته دارویی به وجود می آید به این معناست که شما دچار هیأتیت دارویی سل شده اید و حتما در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید.



جلوگیری از عوارض دارویی

بطور مداوم وزن خود را کنترل نمایید تا میزان دارویی شما تنظیم شود. داروهای خود را مرتب و طبق دستور پزشک مصرف کنید.

علائم و نشانه ها

- بی اشتهاهی
- تهوع
- استفراغ
- احساس سوزش در پاها
- خارش و رویت لک در پوست بدن
- تاول های زیرپوستی
- کاهش شنوایی
- زردی
- دوبینی
- کاهش وزن

تشخیص

معمولا با مراجعه به پزشک و دادن آزمایش خون تشخیص داده میشود اغلب داروهای ضد سل بر کبد اثر دارند و وقتی عوارض خود را نشان می دهند آنزیم های کبدی بالا می روند .

