



آموزش به بیمار

سل مقاوم به درمان



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی

مدیریت پرستاری

واحد آموزشی سلامت

مراقبت در منزل

نظارت مستقیم بر مصرف دارو ها و توجه به علائم افسردگی مهمترین مراقبت در منزل است
حتما در محیط اطراف بیمار اطرافیان باید از ماسک فیلتردار (N95) استفاده کنند .



منبع: www.uptodate.com

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ، می توانید با کلینیک پرستاری آموزش سلامت از ساعت ۸-۱۳ تماس حاصل فرمایید .

۰۵۱۳۵۰۷۲۱۷۱



برای اطلاعات بیشتر با تلفن همراه بارکد زیر را اسکن کنید.



تشخیص

انجام تست های حساسیت دارویی و شروع درمان مناسب و تهیه خلط در سه روز متوالی به صورت ناشتا و انجام کشت خلط

درمان

درمان این بیماری دو سال طول می کشد و مصرف مرتب دارو ها در درمان بسیار موثر است .



hiDoctor.ir


مددجوی عزیز

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده سلامت خود را بازیابید



سل مقاوم به درمان

وقتی شما در هنگام درمان بیماری سل اصول درمان را رعایت نکنید و داروهای خود را به درستی مصرف نکنید نسبت به داروهای سل مقاومت پیدا میکنید و سل مقاوم به درمان به وجود می آید .



عوامل خطر

کسانی که از خوردن داروهای ضد سل خودداری میکنند و نسبت به درمان اولیه بی تفاوت هستند بیشتر در معرض سل مقاوم به درمان می باشند .



علل ایجاد سل مقاوم به درمان

- عدم دسترسی به داروهای سل
- کیفیت پایین داروهای سل
- بیمارانی که دوره درمان را بطور کامل سپری نکنند .

علائم و نشانه ها

تب ، کاهش وزن ، تهوع و استفراغ ، بی اشتها و

