



آموزش به بیمار

تداخلات دارویی و غذایی بخش سل



بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی
مدیریت پرستاری
واحد آموزش سلامت

از مصرف روزانه غذاهای سرخ شده و خیلی چرب پرهیز نمایید. در طول درمان با داروهای سل حتما از قرص ویتامین ب۶ جهت کاهش عوارض داروی اسزونیازید حتما استفاده شود.

جهن جلوگیری از تهوع بعد مصرف داروهای سل به بیمار آموزش می‌دهیم ابتدا صبح ناشتا قرص کوچک سقیدرنگ بنام ویتامین ب۶ را استفاده نماید سپس داروهای سل را مصرف نمایید.

به دنبال مصرف ریفامپین احتمال بروز تب و اسهال ممکن است داشته باشید بهتر است آزمایشات زیاد و میوه و بیضجات تازه در طول شبانه روز استفاده نمایید.



تداخلات دارویی با قرص پروتینامید

این قرص تداخل دارویی ندارد.
از مصرف همزمان داروهای ضدسل با قرص و آمپول پنتوپرازول اجتناب نمایید این داروها اثر داروهای سل را کاهش می‌دهد.

تداخلات غذایی با داروهای بیماری سل

از مصرف الکل در طول درمان بیماری سل پرهیز نمایید.

نوشیدنیهای گازدار نوشیدنی های کافئین دارد در طول درمان بیماری سل کاهش دهید.

مصرف سیگار و مواد مخدر را کاهش دهید.
حداقل ۲ لیتر معادل ۸ لیوان مایعات مصرف نمایید.

داروهای سل را به هیچ عنوان با شیر و دوغ مصرف نکنید.

تداخلات دارویی

منظور از تداخلات دارویی این است که مصرف همزمان یک دارو با سایر داروها، غذاها، نوشیدنی ها یا گیاهان می تواند اثر آن را در بدن تغییر دهد.

به عبارت دیگر، اثربخشی دارو را از آنچه که مورد انتظار است بیشتر یا کمتر کند یا بروز عوارض جانبی غیر منتظره منجر شود.

انواع تداخلات دارویی

۱. تداخل دارو با داروهای دیگر

۲. تداخل دارو با غذا

۳. تداخل دارو با بیماری

تداخلات دارویی بخش سل

قرص ایزونیازید: ممکن است با غذاهایی مانند ماهی تن و بنیر کهنه تداخل داشته باشد به صورت افزایش فشارخون و برافروختگی سردرد و سرگیجه بروز نماید که باید بلافاصله به دکتر مراجعه نمایید

بیمار باید داروهای سل را صبح ناشتا یک الی دو ساعت قبل صبحانه با آب خالی مصرف نماید

قرص ایزونیازید با داروهای ضد عفیدگی مانند فلوکستین سرتالین دز داروهای سل را تغییر میدهد در صورت استفاده از این داروها حتما به دکتر معالج خود اطلاع دهید.

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم. داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین و فنی توئین اثر دارو یا یزدنیازید را کم میکند

تداخلات دارویی با قرص ریفامپین: آنتی اسیدها و داروهای ضد تشنج باید با مشورت دکتر خود مصرف کنید.

قرصهای ضد بارداری در زمان مصرف دارو ریفامپین اثرشان کم میشود.

اثر داروهای دیگوکسین و رقیق کننده های خون مانند

وارفارین را کم میکند..

تداخلات دارویی اتامبوتول. مصرف همزمان این دارو با داروهای بیکربنات سدیم و شربت آلومینیوم هیدروکساید اثر اتامبوتول را کاهش میدهد

تداخلات دارویی قرص پیرازینامید با آمپول رمدسیویر و قرص ولبان و کپسول آموکسی سیلین اثر دارو را کاهش میدهد..

تداخلات دارویی با قرص سیکلوسرین. مصرف همزمان با داروهای فنی توئین احتمال بروز مسمومیت دارویی را بالا میبرد.

تداخلات دارویی با آمپول آمیکاسین: نباید همزمان با آمپول ونکومايسين به مدت طولانی باعث نارسایی کلیه میشود .

در صورت مصرف این دارو با داروهای لازیکس احتمال بروز کری شود.